

Ulostenäytteen anto-ohje kalprotektiinin tutkimista varten 4803 F-Calpro

Yleistä

Tulehduksellisissa suoliston alueen sairauksissa kalprotektiinia vapautuu ulosteeseen, josta se voidaan määrittää.

Tutkimukseen valmistautuminen

Voitte syödä ja juoda normaalisti, ellei teille ole annettu muita ohjeita.

Näytteen antaminen

Näyte suositellaan otettavaksi ensisijaisesti aamun ensimmäisestä ulosteesta.

Ottakaa ulostenäyte wc-paperiin tai puhtaaseen kertakäyttöastiaan.

Siirtäkää peukalonpään kokoinen nokare ulostetta näytepurkkiin (korkeintaan ulostetta saa olla puolet näytepurkin tilavuudesta). Sulkekaa näytepurkki hyvin ja huolehtikaa, ettei ulostetta tule näytepurkin ulkopuolelle.

Näytteenoton jälkeen

Kiinnittäkää näytepurkkiin tarra, jossa lukee nimenne ja henkilötunnuksenne sekä näytteenottopäivämäärä. Laittakaa näytepurkki saamaanne pussiin.

Toimittakaa näytepurkki samana tai viimeistään seuraavana päivänä osastolle, poliklinikalle tai laboratorioon saamaanne ohjeen mukaan. Näytepurkki voidaan säilyttää yön yli huoneenlämmössä.

Mikäli teillä on kysyttävää, saatte lisätietoja hoitoyksiköstänne.