Anvisningar för ett avföringsprov för att undersöka kalprotektin
4803 F-Calpro

Allmänt

Vid inflammatoriska tarmsjukdomar utsöndras kalprotektin i avföringen. Med ett avföringsprov kan man undersöka kalprotektin.

Hur ska man förbereda sig inför undersökning

Ni kan äta och dricka normalt, om inga andra anvisningar getts er.

Provtagning

Rekommendationen är att provet tas från dagens första avföring.

Ni ska ta ett avföringsprov på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.

Sätt en bit avföring av tumspets storlek i provtagningsburken (högst hälften av provtagningsburkens volym). Stäng provtagningsburken ordentligt och se till att ingen avföring hamnar utanför.

Efter att provet tagits

Fäst en etikett märkt med ert namn, er personbeteckning samt provtagningsdatum på provtagningsburken. Sätt provtagningsburken i den påse Ni fått.

Lämna in provtagningsburken samma dag eller senast följande dag till avdelningen, polikliniken eller laboratoriet enligt de anvisningar som Ni fått. Provtagningsburken kan förvaras i rumstemperatur över natten.

Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.

Major Version 1 effective on 8.2.2017