Ulostenäytteenotto helikobakteeriantigeeni- tutkimukseen
3952 F -HePyAg

Tutkimukseen valmistautuminen

Tietyt lääkeaineet vaikuttavat testin tulokseen. Siksi voitte ottaa näytteen aikaisintaan:

- 4 viikon kuluttua helikobakteerihäätöhoidon tai muun antibioottihoidon loppumisesta.
- 2 viikon kuluttua mahahaavan tai vastaavan hoidossa käytettyjen protonipumpun inhibiittori- ja vismuttivalmisteiden käytöstä (mm. Tannopon, Pylorid ja DeNol, Lanzo®, Losec®, Nexium®, Omeprazol, Pariet®, Somac®, Zolt®)

Näytteenottotarvikkeet

Kertakäyttöinen näytteenottoastia, näytteen kuljetukseen tarkoitettu ulostenäytepurkki. Nimitarrat. Muovinen sulkupussi (Minigrip tai vastaava).

Näytteenotto

Ulostakaa puhtaaseen kertakäyttöastiaan. Ulosteeseen ei saisi sekoittua virtsaa.

Näytteen siirtäminen näytepurkkiin: Avatkaa ulostenäytepurkin kansi ja laittakaa purkin kannessa kiinni olevalla lastalla ulostetta purkkiin noin ¼ - ½ purkin tilavuudesta (ei täyteen). Sulkekaa kierrekorkki huolellisesti. Puhdistakaa purkin ulkopinta, mikäli se on tahriintunut ulosteella.

Vetinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi tutkimukseen.

Näytteenoton jälkeen

Täyttäkää nimitarroihin nimenne, henkilötunnuksenne sekä näytteenottopäivämäärä ja liimatkaa tarrat näytepurkkiin. Pakatkaa näytteet sulkupussiin.

Näytteen säilytys ja palauttaminen

Säilyttäkää näytepurkki viileässä, mieluiten jääkaappilämpötilassa.
Toimittakaa näytteet laboratorioon, **viimeistään seuraavana päivänä näytteenotosta**.

Mikäli Teillä on kysyttävää, saatte lisätietoja hoitoyksiköstänne

Major Version 2 effective on 15.5.2017