

Anvisningar för ett avföringsprov för att undersöka helicobacter antigen 3952 F -HePyAg

Hur ska man förbereda sig inför undersökning

Vissa läkemedel påverkar undersökningresultatet. Därför kan Ni ta provet tidigast:

- 4 veckor efter att behandlingen av helicobacter, eller annan antibiotikabehandling avslutats.
- 2 veckor efter att ha använt vismutpreparat och protonpumpshämmare (bland annat Tannopon, Pylorid och DeNol, Lanzo®, Losec®, Nexium®, Omeprazol, Pariet®, Somac®, Zolt®) vid vård av magsåret eller motsvarande.

Provtagningsmateriel

Ett engångsprovtagningsskärl, en avföringsprovburk som är avsedd för transport. Namnetiketter. En förslutbar plastpåse (Minigrip eller motsvarande).

Provtagning

Ni ska ta avföringen i ett rent engångsskärl. Urin bör inte blandas i avföringen.

Överföring av provet till provtagningsburken: Öppna provtagningsburkens lock och sätt avföring i burken med hjälp av spateln i locket, cirka $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ av burkens volym (inte full). Stäng skruvlocket ordentligt. Rengör burkens utsida om den blivit nersmutsad av avföringen.



Rinnande diarréavföring duger inte som prov för undersökningen.

Efter att provet tagits

Fyll i ert namn, er personbeteckning samt provtagningsdatum på namnetiketten och fäst den på provtagningsburken. Packa provet i den förslutbara plastpåsen.

Provets förvaring och returnering

Provtagningsburken ska förvaras svalt, helst i kylskåpstemperatur. Lämna in provet till laboratoriet, **senast följande dag efter att provet tagits.**

Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.