

| | |
|------------------|-------------------|
| Luokka | Laatuj. Työohjeet |
| Versio/pvm | 2 / 11.3.2019 |
| Laatijat | Sepänniemi Aino |
| Vastuuhenkilö | Sepänniemi Aino |
| Hyväksyjä | Kuopus Sirpa |
| Tämä ohje koskee | Oulu |

Lääketaukosuositukset diagnostiseen spirometriatutkimukseen

Ennen diagnostisia keuhkofunktio tutkimuksia tutkittavan tulisi olla ilman seuraavia lääkkeitä vähintään suositeltu aika:

| | |
|---------------------------------|---|
| Antikolinergit | lyhytvaikutteiset 1 vrk, pitkävaikutteiset 2 - 12 vrk |
| Fenyylipropanoliamiini | 12 h |
| Kortikosteroidit | 4 vk |
| Leukotrieeniantagonistit | 3 vrk |
| Natriumkromoglikaatti | 12 h |
| Nedokromiili | 24 h |
| Sympatomimeetit | lyhytvaikutteiset 12 h, pitkävaikutteiset 2 - 7 vrk |
| Teofylliinit | 3 vrk |
| Yskänlääkkeet | 3 vrk |
| Yhdistelmävalmisteet | 48 h - 4 vk |

Taulukko 1. Ennen diagnostisia keuhkofunktio tutkimuksia tauotettavat lääkkeet

| Lääkeaineryhmä | Kauppanimi | Lääketauko vähintään |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Lyhytvaikutteiset antikolinergit | Atro dual, Atrovent, Atrovent comp, Ipramol, Ipraxa | 24 h |
| Pitkävaikutteiset antikolinergit | Eklira, Duaklir | 2 vrk |
| | Anoro, Incruse | 3 vrk |
| | Spiriva | 4 vrk |
| | Inspiolto | 7 vrk |
| | Seebri, Ultibro | 12 vrk |
| Fenyylipropanoliamiini | Rinexin | 12 h |
| Kortikosteroidit # | Aerobec, Alvesco, Asmanex, Beclomet, Budenofalk, Budesonid(e), Budiair, Dexametason, Entocort, Flixotide, Fluticason, Hydrocortison, Medrol, Novopulmon, Prednisolon, Prednison, Pulmicort, Solomet | 4 vk |
| Leukotrieeniantagonistit | Accolate, Astecon, Montelukast, Singulair, Zafirlukast | 3 vrk |
| Natriumkromoglikaatti | Intal, Lomudal (inhalaatiosumute) | 12 h |
| Nedokromiili | Tilade | 24 h |
| Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | Adrenalin, Emerade, Epipen, Airomir, Bricanyl, Buventol, Jext, Ventilastin, Ventoline | 12 h |
| Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | Onbrez, Striverdi | 7 vrk |
| | Cycloterol, Fomeda, Foradil, Formatris, Formaxa, Formoterol, Oxis, Serevent | 2 vrk |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Teofylliinit | Aminocon, Euphylong, Retafyllin, Theofol (comp), Theospirex | 3 vrk |
| Yskänlääkkeet | Kaikki | 3 vrk |
| Muut bronkodilatoivat lääkkeet | Daxas | 5 vrk |
| Yhdistelmävalmisteet (steroidi ja pitkävaikutteinen sympatomimeetti) | Bufomix, Flutiform, Innovair, Salflumix, Salmeson, Seretide, Symbicort Relvar | 48 h tai 4 vk* 72 h tai 4 vk* |

#= muiden sairauksien kuin astman ja COPD:n hoitoon tarkoitettuja systeemilääkkeitä ei tarvitse tauottaa. *= aika 4 viikkoa, jos halutaan sulkea pois kortikosteroidivaikutus

Taulukko 2. Tautettavat lääkkeet aakkosittain

| Kauppanimi | Lääkeryhmä | Tauko väh. | Kauppanimi | Lääkeryhmä | Tauko väh. |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Accolate | Leukotrieeniantagonistit | 3 vrk | Hydrocortison ¹ | Kortikosteroidit | 4 vk |
| Adrenalin | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h | Incruse | Pitkävaikutteiset antikolinergit | 3 vrk |
| Aerobec | Kortikosteroidit | 4 vk | Innovair | Yhdistelmävalmisteet | 48 h / 4 vk ² |
| Airomir | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h | Inspirolo | Pitkävaikutteiset antikolinergit | 7 vrk |
| Alvesco | Kortikosteroidit | 4 vk | Intal | Natriumkromoglikaatti | 12 h |
| Aminocon | Teofylliinit | 3 vrk | Ipramol | Lyhytvaikutteiset antikolinergit | 24 h |
| Anoro | Pitkävaikutteiset antikolinergit | 3 vrk | Ipraxa | Lyhytvaikutteiset antikolinergit | 24 h |
| Asmanex | Kortikosteroidit | 4 vk | Jext | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h |
| Astecon | Leukotrieeniantagonistit | 3 vrk | Lomudal | Natriumkromoglikaatti | 12 h |
| Atrodual | Lyhytvaikutteiset antikolinergit | 24 h | Medrol ¹ | Kortikosteroidit | 4 vk |
| Atrovent | Lyhytvaikutteiset antikolinergit | 24 h | Montelukast | Leukotrieeniantagonistit | 3 vrk |
| Atrovent comp | Lyhytvaikutteiset antikolinergit | 24 h | Novopulmon | Kortikosteroidit | 4 vk |
| Beclomet | Kortikosteroidit | 4 vk | Onbrez | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 7 vrk |
| Bricanyl | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h | Oxis | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk |
| Budesonid(e) | Kortikosteroidit | 4 vk | Prednisolon ¹ | Kortikosteroidit | 4 vk |
| Budíair | Kortikosteroidit | 4 vk | Prednison ¹ | Kortikosteroidit | 4 vk |
| Bufomix | Yhdistelmävalmisteet | 48 h / 4 vk ² | Pulmicort | Kortikosteroidit | 4 vk |
| Buventol | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h | Relvar | Yhdistelmävalmisteet | 72 h / 4 vk ² |
| Cykloterol | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk | Retafyllin | Teofylliinit | 3 vrk |
| Daxas | Muut bronkodilatoivat lääkkeet | 5 vrk | Rinexin | Fenyylipropanoliamiini | 12 h |
| Dexametason | Kortikosteroidit | 4 vk | Salflumix | Yhdistelmävalmisteet | 48 h / 4 vk ² |
| Duaklir | Pitkävaikutteiset antikolinergit | 2 vrk | Salmeson | Yhdistelmävalmisteet | 48 h / 4 vk ² |
| Efedrin | Efedriini | 12 t | Seebri | Pitkävaikutteiset antikolinergit | 12 vrk |
| Efedriini (hydrokl.) | Efedriini | 12 t | Seretide | Yhdistelmävalmisteet | 48 h / 4 vk ² |
| Eklira | Pitkävaikutteiset antikolinergit | 2 vrk | Serevent | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk |
| Emerade | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h | Singulair | Leukotrieeniantagonistit | 3 vrk |
| Epipen | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h | Solomet ¹ | Kortikosteroidit | 4 vk |
| Euphylong | Teofylliinit | 3 vrk | Spiriva | Pitkävaikutteiset antikolinergit | 4 vrk |
| Flixotide | Kortikosteroidit | 4 vk | Striverdi | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 7 vrk |
| Flutiform | Yhdistelmävalmisteet | 48 h / 4 vk ² | Symbicort | Yhdistelmävalmisteet | 48 h / 4 vk ² |
| Fomeda | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk | Theofol (comp) | Teofylliinit | 3 vrk |
| Foradil | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk | Tilade | Nedokromiili | 24 h |
| Formatris | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk | Ultibro | Pitkävaikutteiset antikolinergit | 12 vrk |
| Formaxa | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk | Ventilastin | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h |
| Formoterol | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk | Ventoline | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h |
| Fluticason | Kortikosteroidit | 4 vk | | | |

TÄÄLÄ: Á^!•q } ÁGÁ~&ç^Á } ÁFFÉÉCFJ

| | | |
|---------------|----------------------|-------|
| Yskänlääkkeet | Kaikki yskänlääkkeet | 3 vrk |
|---------------|----------------------|-------|

¹ Tauko vain jos kuuluvat astman tai keuhkohtaumataudin (COPD) hoitoon.

² Aika 4 viikkoa, jos halutaan sulkea pois kortikosteroidivaikutus.

Muutokset tässä versiossa

- Lääkelistat päivitetty.