Anvisningar för provtagning för mykobakterieundersökningar

-TbVi nro 2812

-TbNhO nro 4490

Provtagningsmateriel

Det behövs provtagningsburkar med skruvlock (fabriksrena, tomma burkar) samt remissetiketter. Dessa får ni från den poliklinik som gett undersökningsordinationen, eller från hälsovårdscentral.

Upphostningsprov

Som prov för Mycobacterium undersökning behövs tre upphostningsprov under tre morgnar i följd. Tre prov ökar undersökningens pålitlighet jämfört med endast ett prov. Upphostningsprov tas på morgonen före måltiden. Det är viktigt att få sega upphostningar så djupt inifrån lungorna som möjligt. Enbart saliv är inte tillräckligt som prov.

Provet spottas direkt i en provtagningsburk med skruvlock (varje prov i sin egen burk). Den optimala provmängden är cirka 2–5 ml.

Urinprov

Det lämpligaste provet är morgonurin då urinen varit i urinblåsan så länge som möjligt. 10–50 ml urin tas i provtagningsburken. Underlivstvätt behövs inte före provtagningen.

Efter att provet tagits

Locken på provtagningsburkana ska stängas tätt. Granska att locken är tättslutande så att provtagningsburken inte läcker under transporten.

Fäst en etikett märkt med patientens namn, födelsetid och begäran om undersökning på provtagningskärlen. Skriv dessutom provtagningsdatumet på etiketten.

Varje prov packas skilt i en hel och tättslutande plastpåse (till exempel Minigrip). Plastpåsarna stängs ordentligt.

Proven kan förvaras hemma i kylskåp (+4 C) och lämnas in till laboratoriet på samma gång. Proven ska lämnas in till laboratoriet först efter att det tredje provet tagits.

Prov som inte är tagna eller packade på rätt sätt (är för lite eller läcker) kan inte undersökas.

Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.

Major Version 1 effective on 10.2.2017