

Helicobacter pylorin osoitus uloshengitysnäytteestä

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimus tehdään helikobakteeri-infektion toteamiseksi mahan limakalvolta vatsavaivojen syytä tai helikobakteerin häätöhoidon onnistumista selvitettyä. Varatkaa tutkimukseen aikaa noin yksi tunti. Tutkimus on kivuton, eikä sillä ole todettu sivuvaikutuksia. Tutkimus voidaan tehdä myös raskauden tai imetyksen aikana.

Ennen tutkimusta

Tutkimus voidaan tehdä aikaisintaan kuukauden kuluttua helikobakteerin häätöhoidon loppumisesta. Ennen tutkimusta Teidän tulee välttää taulukossa lueteltuja lääkkeitä.

Lääke	Lääketauko
Helikobakteerihäätöhoito: HELIPAK	Vähintään 4 viikkoa
Muut Antibiootit (jatkuva virtsatie-infektion estolääkitys ei estä tutkimusta)	Kaksi viikkoa
Protonipumpun estäjät: Gasterix, Gastrostad, Giasem, Esomepratsol, Lanrec, Lantill, Lanvone Lanzoprazol, Losec, Losec Mups, Nexium, Omeprazol, Omestad, Pantoprazol, Pantoprazole Pantolac, Panzor Pariet, Rabeprazol Somac, Somac Control, Zolt	Kaksi viikkoa
Antasidit ja limakalvon suoja-aineet: Alsucral, Antepsin, Balancid Novum, Galieve, Gaviscon, Link, Magnesiummaito, Novaluzid, Rennie	Yksi vuorokausi
Suolahapon erityksen estäjät: Cytotec, Famotidin Hexal, Inside, Inside Brus, Pepcid, Pepcid Duo, Ranimex, Ranitidin, Ranisan, Ranixal, Zantac	Yksi vuorokausi
Mahan tyhjenemiseen vaikuttavat lääkkeet: Mestinon, Prepulsid, Primperan, Ubretid, Motilium,	Yksi vuorokausi

Näytteenottopäivänä ennen tutkimusta Teidän tulee olla ravinnotta vähintään 6 tuntia. Vettä saa juoda lasillisen. Älkää myöskään käyttäkö alkoholia 12 tuntiin ennen tutkimusta, älkääkä tupakoiko ½ tuntiin ennen tutkimusta.

Säännöllisesti käytettävät lääkkeet kuten sydän-, verenpaine-, astma-, epilepsialäkkeet yms. tulee ottaa normaalisti veden kanssa. Diabeetikoitten on syytä pyytää ohjeet hoitavalta lääkäriltään.

Jos olette poikennut ohjeista, ilmoittakaa siitä tutkimuksen suorittajalle.

Tutkimuksen suoritus

Ensin puhallatte kevyesti pillillä kahteen koeputkeen merkkiaineen alkupitoisuuden mittaamiseksi. Puhaltamisen jälkeen teille annetaan merkkiainetta sisältävä tabletti vesilasillisen kanssa. Kertokaa tutkimuksen suorittajalle etukäteen, jos ette kykene nielemään merkkiainetta sisältävää tablettia kokonaisuena. Tabletti voidaan ottaa myös veteen liuotettuna.

10 minuutin kuluttua merkkiainetta sisältävän tabletin nauttimisesta puhallatte pillin kautta uudelleen kahteen koeputkeen.

Mikäli Teillä on kysyttävää, saatte lisätietoja hoitoyksiköstänne