

Valmistautumisohje prolaktiini-näytteenottoon 2507 S-PRL

Yleistä

Prolaktiini on aivolisäkkeen erittämä maidontuotantoa edistävä hormoni. Sen eritysvaihtelee vuorokauden ajasta riippuen. Prolaktiinin erityshuippu on yleensä aamuyöstä.

Tutkimukseen valmistautuminen

Näyte tulee ottaa 1–10 päivän sisällä kuukautisten alkamisesta.

Näyte suositellaan otettavaksi klo 10–14 välisenä aikana. Laboratorion viitealueet prolaktiinille on määritetty päiväaikaiselle prolaktiinin eritykselle. Tämän vuoksi on tärkeää, että näytteenottoon saavutaan aikaisintaan noin 4 tunnin kuluttua heräämisestä.

Voitte syödä ja juoda normaalisti, ellei teille ole annettu muita ohjeita.

Stressi saattaa nostaa prolaktiinitasoa. Myös yhdyntä, gynekologinen ja rintojen tutkimus/painelu voivat lisätä prolaktiiniarvoja, joten niitä tulee välttää vuorokauden ajan ennen näytteenottoa.

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa tutkimustulokseen. Pitäkää TAUKO ennen näytteenottoa niiden lääkkeiden käytössä jotka on alla lueteltu (HOITAVA YKSIKKÖ TÄYTTÄÄ). Muut lääkärin määräämät lääkkeet voitte ottaa.

Lääke	Tauko alkaa	Tauko päättyy
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Muu ohje: _____

Mikäli teillä on kysyttävää, saatte lisätietoja hoitoyksiköstänne.