

## Anvisningar för Er som kommer till provtagning av prolaktin 2507 S-PRL

### Allmänt

Prolaktin är ett hormon som utsöndras av hjärnbihanget och som bidrar till mjölkproduktion. Dess utsöndring varierar mellan olika tider på dygnet. Utsöndringsvärdet av prolaktin är vanligen som högst på morgonen.

### Hur ska man förbereda sig inför undersökning

Provet ska tas inom 1–10 dagar från menstruationens början.

Det rekommenderas att provet tas klockan 10–14. Laboratoriets referensområden rörande prolaktin har fastställts för prolaktinutsöndring under dagen. Därför är det viktigt att komma till provtagning tidigast cirka 4 timmar efter att man vaknat.

Ni kan äta och dricka normalt, om inga andra anvisningar getts er.

Stress kan förhöja prolaktinnivåer. Också samlag, gynekologisk undersökning och bröstens undersökning/tryckning kan förhöja prolaktinhalten och därför bör dessa undvikas under ett dygn före provtagningen.

Vissa läkemedel kan påverka undersökningsresultatet. Ni ska hålla PAUS före provtagningen angående de läkemedel som listats nedan (ANTECKNAS AV DEN BEHANDLANDE ENHETEN). Ni kan ta alla andra läkemedel som ordinerats av läkaren.

Läkemedel	Pausen ska börja	Pausen ska avslutas
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Övrig anvisning	_____	

**Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.**