Virtsanäytteen antaminen Klamydia- ja tippuritutkimusta varten
4816 U –CtGcNhO

Tutkimukseen valmistautuminen
Olkaa vähintään yksi tunti virtsaamatta ennen näytteen antamista.

Näytteenottotarvikkeet
Muovinen virtsan keräysastia, korkillinen näyteputki (10 ml), muovinen kertakäyttöpipetti.
Näytteenottotarvikkeet saatte laboratoriosta tai hoitoyksiköstänne.

Näytteenotto
Älkää tehkö alapesua.
Ottakaa virtsasuihkun alusta ensimmäiset n.10 ml keräysastiaan talteen. Virtsasuihkun ensimmäiset pisarat ovat tärkeä saada mukaan. Lopun virtsan voitte laskea WC-pyttyyn.

Siirtäkää näytettä pipetillä keräysastiasta näyteputkeen **4-6 ml (n. ½ putken** tilavuudesta).
Sulkekaa putki huolellisesti korkilla.



Näytteenoton jälkeen

Tyhjentäkää keräysastia WC-pyttyyn ja heittäkää tyhjä astia sitten roskakoriin.

Tarkistakaa, että näyteputken kyljessä on tarralappu, jossa lukee nimenne ja henkilötunnuksenne.
Korjatkaa tarvittaessa näytteenantopäivämäärä ja kellonaika.

Jos nimitarraa ei ole valmiina, kirjoittakaa nimenne, henkilötunnuksenne ja näytteenottopäivämäärä suoraan näyteputken kylkeen tai tyhjään tarralappuun. Liimatkaa tarralappu putken kylkeen.

Näytettä saa säilyttää huoneenlämmössä enintään 24 h.
Toimittakaa näyte laboratorioon tutkittavaksi mieluiten saman päivän aikana.

Mikäli Teillä on kysyttävää, saatte lisätietoja hoitoyksiköstänne

Major Version 3 effective on 8.5.2020