

Valmistautumisohje sekretiinikokeeseen 3380 Pt-Sekr-R2

Yleistä

Sekretiinikokeen tarkoituksena on selvittää gastriinin erittymistä. Gastriini on hormoni, jota erittyy mahalaukun ja pohjukaissuolen soluista. Gastriini lisää mahan suolahapon eritystä. Kokeessa teille annetaan sekretiini-hormonia ja tutkitaan, miten gastriini-hormonin pitoisuus veressänne muuttuu.

Tutkimukseen valmistautuminen

Olkaa syömättä edellisestä illasta klo 20 lähtien. Myös tupakointi sekä kahvin tai teen nauttiminen sen jälkeen on kielletty.

Välttäkää alkoholia koetta edeltävän vuorokauden aikana.

Useat lääkeaineet voivat vaikuttaa tutkimustulokseen. Pitäkää TAUKO ennen näytteenottoa niiden lääkkeiden käytössä, jotka on alla lueteltu (HOITAVA YKSIKKÖ TÄYTTÄÄ). Muut lääkärin määräämät lääkkeet voitte ottaa.

Lääke	Tauko alkaa	Tauko päättyy
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Kokeen suoritus

Kokeen aluksi olette makuullanne 30 min, jonka jälkeen teistä otetaan verinäytteitä. Sen jälkeen teille annetaan sekretiiniä pistoksena. Verinäytteet otetaan vielä 5, 10, 15, 20, 25 ja 30 minuutin kuluttua.

Mikäli teillä on kysyttävää, saatte lisätietoja hoitoyksiköstänne.