

Ohjeen luokka	Näytteenoton käsikirja
Versio/pvm	1.2/ 4.4.2014
Laatijat	T Kouri, V Huotari, J Kauppila
Vastuhenkilö	J Kauppila 4.4.2014
Hyväksyjä	L. Risteli 4.4.2014
Jakelu	vain sähköisenä (NordLab Internet ja NordLab Intranet)

## Rakkopunktionäytteen otto


Rakkopunktiolla näytettä otettaessa rakon tulisi olla mahdollisimman täysi. Toisaalta rakkoärnsytyksen takia näyte voi karata kerääjiltä, ellei lasta seurata tarkasti. Kuumeisia lapsia joudutaan jonkin verran nesteyttämään diureesin käynnistämiseksi.

Ennen rakkopunktiota iho puudutetaan lidokaiini- tai prilokaiinivoiteella ja puhdistetaan antiseptilla. Rakkopunktionäytteen ottaa lääkäri, joka punktoi rakon noin 1cm etäisyydeltä symfyysistä samalla ruiskusta imien (ks. kuva). Symfyysin luukalvon vaurioittamista pyritään varomaan, toisaalta myös suolen punktoimista. Mikäli näytettä saadaan vähän, tutkimusten vähimmäismäärät ovat seuraavat:


1. U-BaktEVi 0,5 ml
2. U-KemSeul 3ml
3. U-Solut 1.5 ml



Lapsen hyvä kiinnipitotapa



Näkymä ylhäältä



Poikkileikkaus