

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Luokka           | Laatuj. Työohjeet               |
| Versio/pvm       | 3 / 22.3.2021                   |
| Laatijat         | Sepänniemi Aino; Männistö Tuija |
| Vastuuhenkilö    | Männistö Tuija                  |
| Hyväksyjä        | Kuopus Sirpa                    |
| Tämä ohje koskee | Kaikki                          |

## Lääketaukосуositukset diagnostiseen spirometriatutkimukseen

Ennen diagnostisia keuhkofunktio tutkimuksia tutkittavan tulisi olla ilman seuraavia lääkkeitä vähintään suositeltu aika:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Lyhytvaikutteiset antikolinergit                     | 1 vrk             |
| Antikolinergi ja sympatomimeetti                     | 1 vrk             |
| Pitkävaikutteiset antikolinergit                     | 2 – 12 vrk        |
| Kortikosteroidit (glukokortikoidit)                  | 4 viikkoa         |
| Kortikosteroidi ja pitkävaikutteinen sympatomimeetti | 48 h - 4 viikkoa  |
| Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit                    | 12 h              |
| Pitkävaikutteiset sympatomimeetit                    | 2 – 7 vrk         |
| Fenyylipropanoliamiini                               | 12 h              |
| Efedriini  | 12 h              |
| Leukotrieeniantagonistit                             | 4 vrk             |
| Kromonit   | 24 h              |
| Teofylliinit   | 3 vrk             |
| Yskänlääkkeet  | 3 vrk             |
| Muut bronkodilatoivat lääkkeet                       | 5 vrk             |
| Muut yhdistelmävalmisteet                            | 3 vrk - 4 viikkoa |



**Taulukko 2. Tautotettavat lääkkeet aakkosittain**

| Kauppanimi                       | Lääkeryhmä                        | Tauko väh.                 |                                    |                                   |                            |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                  |                                   |                            | <i>Inspiroto</i>                   | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 7 vrk                      |
| <i>Adrenalin</i>                 | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       | <i>Intal</i>                       | Kromonit                          | 24 h                       |
| <i>Aerobec</i>                   | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       | <i>Ipratropium/<br/>salbutamol</i> | Antikolinergi + sympatomimeetti   | 24 h                       |
| <i>Airomir</i>                   | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       | <i>Jext</i>                        | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       |
| <i>Alvesco</i>                   | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       | <i>Medrol<sup>1</sup></i>          | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       |
| <i>Aminocont</i>                 | Teofylliinit                      | 3 vrk                      | <i>Montelukast</i>                 | Leukotrieni-antagonistit          | 4 vrk                      |
| <i>Anoro</i>                     | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 3 vrk                      | <i>Novopulmon</i>                  | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       |
| <i>Asmanex</i>                   | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       | <i>Onbrez</i>                      | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 7 vrk                      |
| <i>Astecon</i>                   | Leukotrieni-antagonistit          | 4 vrk                      | <i>Oxis</i>                        | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk                      |
| <i>Atecura</i>                   | Yhdistelmävalmisteet              | 7 vrk / 4 vk <sup>2</sup>  | <i>Prednisolon<sup>1</sup></i>     | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       |
| <i>Atro dual</i>                 | Antikolinergi + sympatomimeetti   | 24 h                       | <i>Prednison<sup>1</sup></i>       | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       |
| <i>Atrovent</i>                  | Lyhytvaikutteiset antikolinergit  | 24 h                       | <i>Pulmicort</i>                   | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       |
| <i>Atrovent comp</i>             | Antikolinergi + sympatomimeetti   | 24 h                       | <i>Racipinephrine</i>              | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       |
| <i>Beclomet</i>                  | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       | <i>Relvar</i>                      | Yhdistelmävalmisteet              | 72 h / 4 vk <sup>2</sup>   |
| <i>Bevespi</i>                   | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 12 vrk                     | <i>Retafyllin</i>                  | Teofylliinit                      | 3 vrk                      |
| <i>Bricanyl</i>                  | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       | <i>Rinexin</i>                     | Fenyylipropanoliamiini            | 12 h                       |
| <i>Budesonid</i>                 | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       | <i>Salfumix</i>                    | Yhdistelmävalmisteet              | 48 h / 4 vk <sup>2</sup>   |
| <i>Budair</i>                    | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       | <i>Salmeson</i>                    | Yhdistelmävalmisteet              | 48 h / 4 vk <sup>2</sup>   |
| <i>Bufomix</i>                   | Yhdistelmävalmisteet              | 48 h / 4 vk <sup>2</sup>   | <i>Salmex</i>                      | Yhdistelmävalmisteet              | 48 h / 4 vk <sup>2</sup>   |
| <i>Buventol</i>                  | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       | <i>Salmeterol/fluticason</i>       | Yhdistelmävalmisteet              | 48 h / 4 vk <sup>2</sup>   |
| <i>Cycloterol</i>                | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk                      | <i>Seebri</i>                      | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 12 vrk                     |
| <i>Daxas</i>                     | Muut bronkodilatoivat lääkkeet    | 5 vrk                      | <i>Seretide</i>                    | Yhdistelmävalmisteet              | 48 h / 4 vk <sup>2</sup>   |
| <i>Dexametason</i>               | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       | <i>Serevent</i>                    | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk                      |
| <i>Duaklir</i>                   | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 2 vrk                      | <i>Singular</i>                    | Leukotrieni-antagonistit          | 4 vrk                      |
| <i>Efedriini</i>                 | Efedriini                         | 12 t                       | <i>Solomet<sup>1</sup></i>         | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       |
| <i>Efedrin</i>                   | Efedriini                         | 12 t                       | <i>Spiriva</i>                     | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 4 vrk                      |
| <i>Efedrina</i>                  | Efedriini                         | 12 t                       | <i>Srivasso</i>                    | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 4 vrk                      |
| <i>Eklira</i>                    | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 2 vrk                      | <i>Striverdi</i>                   | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 7 vrk                      |
| <i>Emerade</i>                   | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       | <i>Symbicort</i>                   | Yhdistelmävalmisteet              | 48 h / 4 vk <sup>2</sup>   |
| <i>Enerzair</i>                  | Yhdistelmävalmisteet              | 12 vrk / 4 vk <sup>2</sup> | <i>Theofol (comp)</i>              | Teofylliinit                      | 3 vrk                      |
| <i>Epipen</i>                    | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       | <i>Theospirex inj</i>              | Teofylliinit                      | 3 vrk                      |
| <i>Flixotide</i>                 | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       | <i>Tilade</i>                      | Kromonit                          | 24 h                       |
| <i>Flutiform</i>                 | Yhdistelmävalmisteet              | 48 h / 4 vk <sup>2</sup>   | <i>Trelegy</i>                     | Yhdistelmävalmisteet              | 3 vrk / 4 vk <sup>2</sup>  |
| <i>Fomeda</i>                    | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk                      | <i>Trimbow</i>                     | Yhdistelmävalmisteet              | 12 vrk / 4 vk <sup>2</sup> |
| <i>Foradil</i>                   | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk                      | <i>Ultibro</i>                     | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 12 vrk                     |
| <i>Formaxa</i>                   | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk                      | <i>Ventilastin</i>                 | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       |
| <i>Formoterol</i>                | Pitkävaikutteiset sympatomimeetit | 2 vrk                      | <i>Ventoline</i>                   | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       |
| <i>Fluticason</i>                | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       | <i>Ventolin (inject)</i>           | Lyhytvaikutteiset sympatomimeetit | 12 h                       |
| <i>Hydrocortison<sup>1</sup></i> | Kortikosteroidit                  | 4 vk                       | <i>Yanimo</i>                      | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 7 vrk                      |
| <i>Incruse</i>                   | Pitkävaikutteiset antikolinergit  | 3 vrk                      | <i>Yskänlääkkeet</i>               | Kaikki yskänlääkkeet              | 3 vrk                      |
| <i>Innovair</i>                  | Yhdistelmävalmisteet              | 48 h / 4 vk <sup>2</sup>   | <i>Zafirlukast</i>                 | Leukotrieni-antagonistit          | 4 vrk                      |

<sup>1</sup> Tauko vain jos kuuluvat astman tai keuhkohtaumataudin (COPD) hoitoon.

<sup>2</sup> Aika 4 viikkoa, jos halutaan sulkea pois kortikosteroidivaikutus.

T ä p | Å ^ | • q } Á Á ~ ~ ~ & c ä ^ Á } Å G Æ B E G F

