

Valmistautumisohje metanefriinin ja normetanefriinin tutkimukseen

Tutkimuksia käytetään esimerkiksi feokromosytooman diagnostiikassa.

Vähintään viikko ennen tutkimusta

Keskustele lääkärisi kanssa mahdollisista tauoista lääkityksessäsi.

Täytä hoitoyksikkösi kanssa lääkitystauot alle:

Lääke	Tauko alkaa	Tauko päättyy

Muut lääkärin määräämät lääkkeet voit ottaa.

2 vuorokautta ennen tutkimusta

Vältä kahvia ja muita kofeiinia sisältäviä juomia kuten teetä, kola- ja energiajuomia. Vältä alkoholia, tupakkaa ja nikotiinituotteita, banaaneja, juustoa, pähkinöitä, kaakaota, suklaata, vaniljaa ja niitä sisältäviä ruokia.

24 tuntia ennen tutkimusta

Jatka yllä olevia juomien ja ruoka-aineiden välttämistä. Vältä lisäksi raskasta liikuntaa.

Tutkimuksen aikana

Jos olet poikennut ohjeesta, kerro siitä näytteenottajalle.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää, niin ota yhteyttä lähettävään / omaan hoitoyksikköön.

Tutkimuslyhenteet ja tilausnumerot

2338 S -MetNor